# DESCRIPTION DE DEUX GENRES NOUVEAUX

#### DE LA FAMILLE DES SALAMANDRIDES

#### Par M. G. A. BOULENGER

M. le Dr Sauvage a décrit récemment (1) deux espèces nouvelles de Salamandrides de Chine qu'il a rapportées aux genres *Triton* et Salamandrella. Ces espèces nous paraissant nécessiter l'établissement de deux genres nouveaux, M. Sauvage a eu la bonté de nous permettre de les décrire sur les spécimens types du Muséum de Paris. Nous tenons à lui en exprimer notre sincère reconnaissance.

Ainsi qu'on le verra par les caractères que nous donnons plus loin, ces espèces ne peuvent être maintenues à la place que M. Sauvage leur a assignée provisoirement.

L'une, la Salamandrella sinensis, a les plus grands rapports avec le Ranodon sibiricus, Kessler, dont elle ne diffère que par le nombre des orteils. Le genre Salamandrella, Dybowsky (Isodactylium, Strauch) en diffère par la disposition des dents palatines qui affectent, comme chez Ellipsoglossa, la forme d'un V.

L'autre, le *Triton brevipes*, réunit la physionomie des Salamandrides les plus inférieurs, la dentition de certains Tritons et la langue des Sirénides (*Necturus*, *Proteus*, *Siren*.) et des larves de Salamandrides. Ses formes semblent indiquer un séjour constant dans l'eau, comme c'est le cas pour le genre *Megalobatrachus*, Tsch. (*Sieboldia*, Bp.) qui ne possède également pas de branchies.

## Batrachuperus, g. n. (2)

Car. Langue ovalaire, assez grande, libre seulement sur les côtés. Dents palatines formant, entre les arrière-narines, deux groupes arqués, à convexité dirigée en avant, non réunis au milieu. Yeux de grandeur moyenne, à paupières bien développées. Tête peu élargie. Gorge plissée longitudinalement; un pli très-accentué en travers,

- (4) Bulletin de la Société Philomatique de Paris, 7º sér., t. 1er, nº 3, 4877.
- (2) Βάτραζος, grenouille, Υπςρώα, palais.

remontant sur les côtés du cou. Un sillon se dirigeant de l'angle postérieur des paupières jusqu'au pli collaire; un autre sillon, perpendiculaire au premier, le réunit à l'angle des mâchoires. Tronc assez allongé, arrondi; des sillons verticaux, au nombre de dix ou onze, de chaque côté. Quatre doigts et quatre orteils, libres, assez allongés. Membres moyens. Orifice anal longitudinal. Queue peu comprimée à la base, tranchante, peu pointue à l'extrémité. Peau lisse, poreuse en dessus, épaissie mais non crypteuses sur les régions parotidiennes. Pas de crète dorsale ni de caudale.

Espèce unique : Batrachuperus sinensis (Salamandrella sinensis, Sauvage).

### Pachytriton, g. n. (1)

Car. Langue épaisse, couvrant tout le plancher de la bouche, libre légèrement en avant seulement. Dents palatines sur deux lignes longitudinales, naissant entre les arrière-narines, en forme de V renversé, à branches ne se touchant pas en avant. Bouche peu fendue. Crâne étroit. Yeux petits, à paupières très-peu développées. Tête élargie en arrière. Pas de pli en travers de la gorge. Tronc assez allongé, un peu déprimé. Membres courts, trapus. Quatre doigts et cinq orteils, libres. Orifice anal longitudinal. Queue longue, arrondie à la base, fortement comprimée à l'extrémité. Peau lisse, épaissie mais non crypteuse sur les régions parotidiennes. Pas de plis sur les côtés du tronc. Pas de crête dorsale. Une crête caudale, peu développée, sur les deux tiers postérieurs de la queue.

Espèce unique : Prachytriton brevipes (Triton brevipes, Sauvage).

(1) Παχύς, épais, Τριτων.